L'INFERTILITE

EPIDEMIOLOGIE

- Infertilité touche 20% des couples en France

DEFINITIONS :

- Fécondité: fait d'avoir un enfant
- Fertilité: aptitude à procréer un enfant
- Stérilité : jamais de grossesse à terme
- Azoospermie = absence totale de spz (obstructive ou non obstructive)
- Oligospermie : <20 millions de spz /ml
- Asthenospermie : défaut de mobilité des spz
- Teratospermie : <50% des spz de forme typique

■ Parmi couples touchés par infertilité :

- 20% facteur masculin isolé
- 40% facteur mixte

..... soit facteur masculin présent dans 60%

■ Chez couples fertiles:

- Dans 50% des cas grossesse dans les 6 mois après arrêt contraception
- Dans 90% des cas la première année

■ **DONC on initie une évaluation de la fertilité qu'après 1 an de tentatives infructueuses de grossesse**

PREMIERE CONSULTATION

■ INTERROGATOIRE

- Age ds premiers rapports, fréquence des rapports
- ATCD
 - Med : oreillons, IST, prostatite,
 - Chir : cryptorchidie, torsion, trauma, cancer
- Consommation tabac, cannabis, alcool
- Dopants (stéroïdes anabolisants)
- Profession (plomb, pesticides ?)
- Excès de sauna, jacuzzi

EXAMEN CLINIQUE

- Examen des organes génitaux externes (testicules et cordon spermatique), examen de la verge
- Gynécomastie, caractères sexuelles secondaires

EXAMENS COMPLEMENTAIRES

■ 1ère intention:

- Spermogramme (mobilité, nombre, forme, pH, volume)
- Test post-coïtal de Hünner: prélèvement de glaire cervicale 12H après un rapport avec étude de la migration, pénétration et de la survie des spermatozoïdes.

■ 2ème intention:

- Bilan hormonal (FSH LH testostéronémie)
- ECBU et spermoculture
- Échographie
 - scrotale
 - Transrectale
 - Rénale
- Caryotype
- Déférentographie

ETIOLOGIES

■ Infertilité sécrétoire:

- Déficit endocrinien hypothalamo-hypophysaire
= insuffisance de sécrétion de LH-FSH

- Déficit testiculaire primaire : hypogonadisme normo gonadotrope
- Infertilité excrétoire:
 - Anomalie acquise:
 - post-traumatique
 - post-infectieuse.
 - Anomalie congénitale: agénésie des voies séminales (associée dans 30% à une anomalie du haut appareil)

TRAITEMENT

- Hormonothérapie
- Antibiotiques
- Chirurgie
 - Réparatrice canalaire
 - Prélèvement chirurgical des spermatozoïdes
- AMP
 - Insémination intra-conjugale 10 à 15% de succès
 - FIV (rapprochement spz et ovule) 15-20%
 - Injection intra-cytoplasmique (injection spz dans un ovocyte) 20%
 - Insémination artificielle avec sperme de donneur 12%

AFFECTION DES TESTICULES ET DE LA VERGE

ADAM.

- Cordon spermatique
- Canal déférent
- Epididyme
- Vaginale
- Albuginée

TORSION DU TESTICULE

■ **URGENCE UROLOGIQUE ABSOLUE**

- Touche les enfants, adolescents et adultes jeunes
- Testicule extrêmement douloureux, ascensionné, rétracté à l'anneau
 - Intervention en urgence
 - Nécrose testiculaire en 6h

HYDROCELE

- Apparition de liquide séreux dans la vaginale
- Congénitale (pathologie du canal péritonéo-vaginal)
- Réactionnelle: torsion, orchépididymite, traumatisme...
- Clinique: transillumination positive

AUTRES PATHOLOGIES DU CANAL PERITONEO-VAGINAL

- Hernie inguino-scrotale :

- Kyste du cordon :

DEFAUT DE MIGRATION DU TESTICULE

- 30% des enfants prématurés
- Cryptorchidie

- Ectopie testiculaire

HYPOSPADIA

- Défaut de fermeture de la gouttière urétrale
- Méat urétral plus bas situé

MALADIE DE LAPEYRONNIE

- Défaut de courbure de la verge
- Infertilité en raison de l'impossibilité du coït
- Traitement médical ou chirurgical

CANCER DU PENIS

- Lésion dégénérative le plus souvent à partir du sillon balanopréputial
- Très mauvais pronostic

DYSFONCTION ERECTILE

- Tumescence des corps caverneux
- Relaxation du tissu érectile
- Blocage du retour veineux

Bilan :

- Composante psychogène
- Composante organique
 - Artérielle
 - Neurologique
 - Endocrinienne
 - Altération du tissu érectile
 - Post-chirurgicale: prostatectomie, chirurgie rectale...
- Interrogatoire
- Examen clinique
- Biologie: Testostéronémie totale +/- glycémie et PSA
- Autres: test intra-caverneux, pléthysmographie nocturne, cavernographie, artériographie des artères de la verge, électrophysiologie

Traitements :

- Soutien psychologique
- Traitement médicamenteux
 - Cialis, Viagra: relaxation du tissu musculaire lisse intra-caverneux
 - Injections intra-caverneuses de prostaglandines
- Vacuum
- Chirurgie: pontage artériel, prothèse pénienne